

Mielőtt elkezdene gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása. Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez. Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

Milyen hatóanyagot és segédanyagot tartalmaz a készítmény? Hatóanyag: 40 mg nátrium paraklórbenzoát 1 g hintőporban. Segédanyagok: cink-oxid, talkum

Milyen típusú gyógyszer a Mycosid külsőleges por és milyen betegségek esetén alkalmazható? A hintőpor külsőleges alkalmazású, gombaellenes, enyhe összehúzó és viszketéscsillapító hatású gyógyszer, amely mind száraz, mind nedvedző klinikai elváltozásokat okozó felületi gombás bőrfertőzések megelőzésére és kezelésére javallt.

Mikor nem szabad használni ezt a gyógyszert? A hatóanyaggal és a segédanyagokkal szembeni ismert túlérzékenységek esetén. Gyermekkorban, valamint terhesség és szoptatás ideje alatt fokozott körültekintéssel alkalmazható.


meditop



Hogyan alkalmazza a készítményt? Az érintett bőrfelület alapos mosása és szárazra törlése után alkalmazható. Megelőzésre: test hajlatok, illetve a lábfej behintésére, és főleg zárt, rosszul szellőző lábbeli rendszeres viselésékor naponta 1 alkalommal. Kialakult fertőzések kezelésére: a leggyakrabban érintett területek (láb, lábujjak közei és az ágyéki, hónalj, emlők alatti és egyéb testhajlatok)

behintése naponta 1-2 alkalommal. Lábgombásodás esetén a zoknit és a cipő belsejét is szórja be az újra fertőződés megelőzése érdekében.

Külsőleg!

MYCOSID

külsőleges por

zott körültekintéssel alkalmazható.

Alkalmazható-e más gyógyszerekkel egyidejűleg? A Mycosid külsőleges por más külsőleges készítménnyel egyidejűleg nem alkalmazható.

OGYI-T-2901/01 | A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2010. június 28. | A forgalombahozatali engedély jogosultja: Meditop Gyógyszeripari Kft. 2097 Pilisborosjenő, Ady Endre u. 1.



Gysz:

Gyi:

Felh.:

FIGYELMEZTETÉS:

A Mycosid külsőleges készítmény; szembe és testüregekbe juttatni, lenyelni, továbbá belelegezni tilos.

Kialakulhatnak-e mellékhatások az alkalmazás során? Ritkán helyi bőrirritáció előfordulhat. Ilyen esetben a hintőport bő, szappanos vízzel le kell mosni.

Hogyan kell tárolni a készítményt? Szobahőmérsékleten 15-25 °C között tartandó. A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

CMYCHU1216

 **MAGYAR
GYÓGYSZER**

100 g